

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 2-7-68 798945

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 9238-572

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE MONTPELLIER

Abonnement Annuel

25 francs

N° 93 - JUIN 1968/21

4° supplément

Montpellier le 28/6/1968

NOTE : 9

MILDIU - L'invasion de mildiou attendue pour le 26 juin s'est montrée à la date prévue; peu importante ou nulle sur les vignes qui se trouvaient bien protégées au moment des grosses pluies orageuses de la nuit du 18 au 19 juin, elle est en revanche très violente sur le feuillage de celles qui l'étaient moins.

Les innombrables efflorescences qu'elle a fait naître provoqueront de nouvelles contaminations si d'autres pluies viennent à se produire.

Quant aux dégâts sur les grappes, ils apparaîtront d'ici quelques jours.

Il semble donc utile -dans le secteur Sud-Est de Montpellier notamment- de maintenir une cadence de traitements capable d'assurer la protection de la végétation qui se développe encore.

VERS DE LA GRAPPE -- Le vol de deuxième génération de papillons est actuellement assez faible à Ginestas (Aude); Baixas, Toulouges, Trouillas (Pyrénées-Orientales); Le Grau-du-Roi-Espiguette (Gard); le traitement préventif (D.D.T.) qui s'y rapporte est à effectuer dès le 29 juin.

Le Directeur de la Station Régionale d'Avvertissements
Viticoles : G. BERNON

---:---:---:---:---:---

LE MILDIU DE LA POMME DE TERRE

Ce Mildiou, le plus souvent, ne donne pas beaucoup de souci aux cultivateurs méridionaux en raison de la climatologie habituellement sèche du printemps, qui permet aux producteurs de pommes de terre de primeurs et d'été d'éviter les traitements anticryptogamiques.

Dans les régions d'altitude moyenne et de montagne, où la pomme de terre est cultivée pour la conservation il est souvent nécessaire d'assurer une protection des fanes de juin à la mi-août.

L'évolution du champignon responsable du mildiou est conditionnée par l'humidité (pluie et rosée) et la chaleur.

Actuellement les circonstances favorables à cette évolution ont été réunies et nous avons appris l'existence de petits foyers où la maladie s'était manifestée. C'est pourquoi nous recommandons l'exécution immédiate d'un traitement (pour le choix du produit se reporter à la note spéciale). On pourra ajouter un insecticide compatible pour lutter contre le Doryphore.

D'autres avis seront donnés selon nécessité.

L.L. TROUILLON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 28 Juin 1968